



COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Boletim Mensal da Qualidade do Ar para o Estado de São Paulo - Nº 7

Julho de 2021

Boletim Mensal da Qualidade do Ar para o Estado de São Paulo - N° 7 Julho de 2021

Poluição e Saúde

A poluição do ar é um dos mais significantes impactos causados pela atividade humana.

Mesmo com a crescente melhoria na qualidade do ar, o peso das doenças relacionadas com este tipo de poluição aumenta à medida que as populações crescem, envelhecem e se tornam mais susceptíveis a doenças relacionadas com o problema.

A poluição do ar é um fenômeno tipicamente urbano industrial.

Industrial visto que as indústrias, via de regra, lançam poluentes à atmosfera.

Urbano principalmente devido à necessidade de deslocamento de grande número de pessoas, são utilizados vários meios de transporte, a maioria dos quais lança poluentes à atmosfera.

**População do Estado em 2020
Número de habitantes.**

Até 100.000 = 564 Municípios

De 100.000 a 400.000 = 64 Municípios

De 400.000 a 1.000.000 = 14 Municípios

Acima de 1.000.000 = 3 municípios

Total do Estado = 645 municípios com 46.289.333 hab.

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) = 39 municípios com 21.893.842 hab.

São Paulo Capital = 12.325.232 hab.

Qualidade do ar e efeitos à saúde

Os efeitos à saúde dependem do tipo de poluente e dos níveis dos mesmos na atmosfera.

Na tabela a seguir estão apresentados os efeitos à saúde relacionados à classificação da qualidade do ar para exposição de curto prazo.

Classificação da qualidade do ar e efeitos à saúde – Exposição de curto prazo		
Qualidade	Índice	Significado
N1 - BOA	0 - 40	
N2 – MODERADA	41-80	Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas) podem apresentar sintomas como tosse seca e cansaço. A população, em geral, não é afetada.
N3 – RUIM	81-120	Toda a população pode apresentar sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta. Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas) podem apresentar efeitos mais sérios na saúde.
N4 – MUITO RUIM	121-200	Toda a população pode apresentar agravamento dos sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta e ainda falta de ar e respiração ofegante. Efeitos ainda mais graves à saúde de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas).
N5 – PÉSSIMA	>200	Toda a população pode apresentar sérios riscos de manifestações de doenças respiratórias e cardiovasculares. Aumento de mortes prematuras em pessoas de grupos sensíveis.

Quando a qualidade do ar é classificada como BOA, os valores de referência de curto-prazo recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) estão sendo atendidos.

Redes de Medição da Qualidade do Ar

A REDE - O conjunto de equipamentos de medição de qualidade do ar colocados em várias cidades e em locais específicos de cidades paulistas é chamado de “Rede de Monitoramento”. São dois os objetivos principais que a CETESB tem ao operar esta rede. Um deles é a verificação das concentrações de poluentes que a população respira e, portanto, se sua saúde está sendo afetada. O outro é permitir a análise dos dados históricos, obtidos ao longo dos anos, de modo a orientar as ações de controle. **O diagnóstico feito pela CETESB é baseado na medição de poluentes efetuada em diferentes tipos de equipamentos. São gerados mensalmente cerca de 200.000 dados nas diferentes redes existentes.**

POLUENTES - Cada poluente é monitorado por um equipamento específico. Na denominada **REDE AUTOMÁTICA**, o ar é amostrado, analisado e, em tempo real, os dados são enviados à central alocada na sede da CETESB. Ocorre a divulgação em tempo real à população. Há também estações que possuem equipamentos que coletam amostras que são enviadas a laboratório da CETESB para análise e constituem a denominada **REDE MANUAL**.

METEOROLOGIA - Também faz parte da rede a obtenção de dados meteorológicos visto que a concentração dos poluentes é afetada não só pelos poluentes ali lançados mas também pelo grau de dispersão das substâncias liberadas ao ambiente, destacando-se como agentes importantes os ventos, a chuva e a inversão térmica de baixa altitude.

POPULAÇÃO ATENDIDA - As estações são distribuídas de acordo com o conceito de que a poluição do ar é um fenômeno urbano/industrial. Cidades populosas ou de alta industrialização recebem prioritariamente equipamentos. A racionalização de instalações leva a verificar a qualidade do ar apenas onde há indícios de emissão significativa de poluentes, uma vez que tanto a rede automática e como a rede manual envolvem uma soma expressiva de recursos, tanto em sua aquisição como na operação.

Cidades monitoradas pela CETESB	Número de estações (manuais e automáticas)	População atendida	% do Estado
42	87	27,6 milhões	60%

Fonte: IBGE - Estimativa de população em 01/07/20

(<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?=&t=downloads>)

Dados de Qualidade do Ar do Mês

Este BOLETIM apresenta um resumo dos dados obtidos no mês. Os dados são apresentados de acordo com as redes que os geram. Os produzidos pela rede automática, por serem contínuos, são apresentados com associação aos efeitos à saúde (vide item Poluição e Saúde). Já nos gerados em equipamentos manuais, as amostragens são feitas a cada 6 dias, frequência que possui bastante aderência estatística com média anual, mas não possuem significado maior em termos de caracterizar o mês completo a partir de apenas 5 dados. Por essa razão, para este tipo de medição são apresentados os dados de concentração diretamente, sem qualificação de qualidade do ar.

Atenção ao título das tabelas que contém a informação das médias consideradas, por ser esse o critério de saúde. Assim considera-se para todos os particulados a média de 24 horas, para monóxido de carbono e ozônio, média máxima de oito horas no dia, e para dióxido de nitrogênio a máxima horária observada no dia.

Destaque do Mês

No mês de julho, destaca-se o aumento das concentrações de material particulado, em função das condições meteorológicas observadas no inverno, com vários dias de qualidade MODERADA em diversas localidades do estado de São Paulo, atingindo em alguns dias a qualidade RUIM, principalmente pelo MP_{2,5}.

Poluição e Meteorologia do Mês

Durante o mês de julho, houve passagens de frentes frias pelo litoral paulista, porém com poucas condições para ocorrência de precipitação na parte continental, conseqüentemente as chuvas ficaram abaixo da normalidade climatológica em todos os municípios estado de São Paulo. Houve atuação de três massas de ar frio que atingiram todo o estado e mantiveram as temperaturas amenas, com ocorrência de dias muito frios, sendo observadas, no dia 30/07/21, as menores temperaturas registradas no ano, com recorde de temperatura mínima de -4,1 °C em Rancharia. Nesse dia a capital paulista registrou a temperatura mínima de 4,3°C na estação Mirante de Santana do INMET e 1,7 °C na estação Pico do Jaraguá da CETESB. As baixas temperaturas e menor incidência de radiação solar, comum nessa época do ano, mantiveram a qualidade do ar predominantemente BOA, em todo o estado, em relação ao ozônio, atingindo, em alguns locais, a qualidade MODERADA. No entanto, durante o mês também foram observados alguns dias, em que o estado esteve sob a atuação de massas de ar seco e estável, com pouca nebulosidade e ventos fracos, com muitas horas de calma durante a noite e madrugada, além de inversões térmicas abaixo de 200m de altura, que tiveram influência na qualidade MODERADA para material particulado observada em várias localidades do estado, atingindo a qualidade RUIM em alguns locais. Na estação de Cubatão- Vila Parisi, localizada na área industrial, foi observado um dia com qualidade MUITO RUIM para material particulado e um dia com qualidade RUIM para dióxido de enxofre.

Ozônio

O ozônio é um poluente que não é emitido diretamente na atmosfera por nenhuma fonte, mas formado através da reação entre os óxidos de nitrogênio (emitidos por processos de combustão - veicular e industrial) e dos compostos orgânicos voláteis (emitidos em processos evaporativos, queima incompleta de combustíveis automotivos e em processos industriais), na presença de luz solar.

Historicamente as concentrações mais elevadas ocorrem com maior frequência no período de primavera/verão, época em que a incidência da radiação solar é mais intensa e as temperaturas são mais elevadas.

O comportamento do ozônio é apresentado em percentagem de dias que a concentração se situa em cada uma das faixas que são associadas a índices que refletem critérios de efeitos na saúde.

Resultados O₃

Ozônio (O ₃) - Julho/2021 – (máxima média móvel de 8 horas)							
Estação	Qualidade e faixa de concentração					N	Repr.
	Boa	Moderada	Ruim	Muito Ruim	Péssima		
	0 - 100 µg/m ³	>100 - 130 µg/m ³	>130 - 160 µg/m ³	>160 - 200 µg/m ³	>200 µg/m ³		
RMSP	Capão Redondo*	-	-	-	-	-	-
	Carapicuíba	100%					31 S
	Cid.Universitária-USP-Ipen	83%	17%				29 S
	Diadema	100%					30 S
	Grajaú-Parelheiros	100%					31 S
	Guarulhos-Paço Municipal	97%	3%				31 S
	Guarulhos-Pimentas	100%					31 S
	Ibirapuera	94%	6%				31 S
	Interlagos	100%					31 S
	Itaim Paulista	100%					31 S
	Itaquera*	-	-	-	-	-	- -
	Mauá	100%					31 S
	Mooca	100%					31 S
	Nossa Senhora do Ó	100%					31 S
	Parque D.Pedro II	100%					31 S
	Perus	97%	3%				31 S
	Pico do Jaraguá	97%	3%				31 S
	Pinheiros	100%					31 S
	S.André-Capuava	90%	10%				31 S
	S.Bernardo-Centro	90%	10%				31 S
Santana	97%	3%				31 S	
Santo Amaro*	-	-	-	-	-	- -	
São Caetano do Sul	100%					28 S	

N = Número de dias válidos

Repr. = Atende ao critério de representatividade mensal dos dados : S (sim) e N (não)

* Dados indisponíveis devido a questões operacionais

Ozônio (O ₃) - Julho/2021 – (máxima média móvel de 8 horas)								
Estação	Qualidade e faixa de concentração					N	Repr.	
	Boa	Moderada	Ruim	Muito Ruim	Péssima			
	0 - 100 µg/m ³	>100 - 130 µg/m ³	>130 - 160 µg/m ³	>160 - 200 µg/m ³	>200 µg/m ³			
Interior e Litoral do Estado	Americana	94%	6%				31	S
	Araçatuba*	-	-				-	-
	Araraquara	81%	19%				31	S
	Bauru	100%					31	S
	Campinas-Taquaral	97%	3%				31	S
	Campinas-V.União	100%					31	S
	Catanduva	93%	7%				28	S
	Cubatão-Centro	100%					31	S
	Cubatão-Vale do Mogi	100%					24	S
	Guaratinguetá	100%					31	S
	Jacareí	100%					30	S
	Jaú*	-	-	-	-	-	-	-
	Jundiá	100%					31	S
	Limeira	100%					31	S
	Marília	97%	3%				31	S
	Paulínia	100%					31	S
	Paulínia-Sta Terezinha	100%					31	S
	Piracicaba	100%					31	S
	Presidente Prudente	97%	3%				31	S
	Ribeirão Preto	100%					31	S
	Rio Claro-Jd.Guanabara	100%					31	S
	S.José Campos	100%					31	S
	S.José Campos-Jd.Satélite	100%					31	S
	Santos*	-	-	-	-	-	-	-
	Santos-Ponta da Praia	100%					17	N
	São José do Rio Preto*	-	-	-	-	-	-	-
Sorocaba	100%					31	S	
Tatuí	100%					31	S	
Taubaté	100%					31	S	

N = Número de dias válidos

Repr. = Atende ao critério de representatividade mensal dos dados : S (sim) e N (não)

* Dados indisponíveis devido a questões operacionais

Material Particulado

Constituído de partículas sólidas ou líquidas, pequenas o suficiente para se manterem suspensas no ar. Sem característica química definida, tem importância também pelo tamanho que se apresenta. Destacam-se em termos de saúde as partículas menores que 10 micra, chamadas de partículas inaláveis - **MP₁₀** e também as menores que 2,5 micra, chamadas de partículas inaláveis finas - **MP_{2,5}**.

Resultados MP₁₀

Rede Automática

A apresentação dos dados é feita em percentagem de dias que a concentração se situa em cada uma das faixas que são associadas a índices que refletem critérios de efeitos na saúde.

Partículas Inaláveis (MP ₁₀) - Julho/2021 (média de 24h)									
Estação	Qualidade e faixa de concentração					Conc. Média (µg/m ³)	N	Repr.	
	Boa 0 - 50 µg/m ³	Moderada >50 - 100 µg/m ³	Ruim >100 - 150 µg/m ³	Muito Ruim >150 - 250 µg/m ³	Péssima >250 µg/m ³				
RMSP	Capão Redondo	71%	29%				36	31	S
	Carapicuíba	58%	42%				46	31	S
	Cerqueira César	68%	32%				38	25	S
	Congonhas	69%	31%				40	29	S
	Diadema	85%	15%				35	27	S
	Grajaú-Parelheiros	68%	32%				42	31	S
	Guarulhos-Paço Municipal	58%	42%				45	31	S
	Guarulhos-Pimentas	39%	61%				54	23	S
	Interlagos	87%	13%				32	31	S
	Itaim Paulista	48%	52%				49	31	S
	Marg.Tietê-Ponte dos Remédios	55%	42%	3%			49	31	S
	Mauá	52%	48%				48	31	S
	Nossa Senhora do Ó	68%	32%				39	31	S
	Osasco	45%	45%	10%			57	31	S
	Parque D.Pedro II	55%	45%				46	31	S
	Perus	50%	50%				52	30	S
	Pinheiros	68%	32%				40	31	S
	S.André-Capuava	69%	31%				40	29	S
	S.Bernardo-Paulicéia	81%	19%				34	31	S
	Santo Amaro	84%	16%				31	31	S
São Caetano do Sul	71%	29%				38	31	S	
Taboão da Serra	65%	35%				41	31	S	

N = Número de dias válidos

Repr. = Atende ao critério de representatividade mensal dos dados : S (sim) e N (não)

* Dados indisponíveis devido a questões operacionais

Partículas Inaláveis (MP ₁₀) - Julho/2021 (média de 24h)									
Estação	Qualidade e faixa de concentração					Conc. Média (µg/m ³)	N	Repr.	
	Boa 0 - 50 µg/m ³	Moderada >50 - 100 µg/m ³	Ruim >100 - 150 µg/m ³	Muito Ruim >150 - 250 µg/m ³	Péssima >250 µg/m ³				
Interior e Litoral do Estado	Americana	48%	52%			51	31	S	
	Araçatuba	61%	39%			45	31	S	
	Araraquara	68%	32%			46	31	S	
	Bauru	68%	32%			40	31	S	
	Campinas-Centro	100%				32	31	S	
	Campinas-Taquaral	94%	6%			30	31	S	
	Catanduva	35%	65%			58	31	S	
	Cubatão-Centro	94%	6%			29	31	S	
	Cubatão-Vale do Mogi	81%	19%			35	31	S	
	Cubatão-Vila Parisi	14%	63%	20%	3%	78	30	S	
	Guaratinguetá*	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jacaré	100%				27	31	S	
	Jaú	89%	11%			36	28	S	
	Jundiaí	90%	10%			33	31	S	
	Limeira	42%	58%			52	31	S	
	Marília	97%	3%			34	31	S	
	Paulínia	71%	29%			43	31	S	
	Paulínia-Sta Terezinha	90%	10%			39	31	S	
	Piracicaba	48%	52%			52	31	S	
	Presidente Prudente*	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ribeirão Preto	45%	55%			52	31	S	
	Rio Claro-Jd.Guanabara	26%	71%	3%		66	31	S	
	S.José Campos	97%	3%			30	31	S	
	S.José Campos-Jd.Satélite	90%	10%			32	31	S	
	Santa Gertrudes	19%	65%	16%		78	31	S	
	Santos*	-	-	-	-	-	-	-	-
	Santos-Ponta da Praia	87%	13%			37	23	S	
	São José do Rio Preto	45%	55%			49	31	S	
Sorocaba	87%	13%			29	31	S		
Tatuí	81%	19%			31	31	S		
Taubaté	94%	6%			32	31	S		

N = Número de dias válidos

Repr. = Atende ao critério de representatividade mensal dos dados : S (sim) e N (não)

* Dados indisponíveis devido a questões operacionais

Rede Manual

São apresentados os dados de concentração obtidos a cada 6 dias.

Partículas Inaláveis (MP ₁₀) - Julho/2021 (média de 24h)						
Estação		Concentração (µg/m ³)				
		05/jul	11/jul	17/jul	23/jul	29/jul
Interior do Estado	Cordeirópolis-Módolo	81	68	31	85	29
	Franca-Cidade Nova	25	31	41	42	25
	Guarujá-Vicente de Carvalho	-	-	22	49	18
	Jaboticabal-Jd. Kennedy*					
	Santa Gertrudes -Jd. Luciana	93	119	57	-	53

- Amostragem Inválida ou Ausência de Dados

* equipamento com problema técnico

Resultados MP_{2,5}

Rede Automática

Assim como os dados de MP₁₀ obtidos automaticamente, os dados de MP_{2,5} são apresentados por faixas de concentração associadas a critérios de saúde.

Partículas Inaláveis Finas (MP _{2,5}) - Julho/2021 (média de 24 h)									
Estação	Qualidade e faixa de concentração					Conc. Média (µg/m ³)	N	Repr.	
	Boa	Moderada	Ruim	Muito Ruim	Péssima				
	0 - 25 µg/m ³	>25 - 50 µg/m ³	>50 - 75 µg/m ³	>75 - 125 µg/m ³	>125 µg/m ³				
RMSP	Cid.Universitária-USP-Ipen	68%	32%				21	28	S
	Congonhas	61%	39%				22	31	S
	Grajaú-Parelheiros	65%	32%	3%			21	31	S
	Guarulhos-Paço Municipal	48%	52%				25	27	S
	Guarulhos-Pimentas	48%	52%				26	31	S
	Ibirapuera	100%					9	4	N
	Itaim Paulista	48%	52%				26	31	S
	Marg.Tietê-Ponte dos Remédios	48%	36%	16%			28	31	S
	Mauá	65%	35%				20	31	S
	Mooca	68%	32%				21	31	S
	Osasco	35%	42%	23%			35	31	S
	Parque D.Pedro II	55%	42%	3%			23	31	S
	Perus	57%	43%				23	30	S
	Pico do Jaraguá	97%	3%				15	31	S
	Pinheiros	52%	45%	3%			26	29	S
	S.Bernardo-Centro	81%	19%				18	31	S
Santana	52%	45%	3%			26	29	S	
São Caetano do Sul	65%	35%				21	31	S	
Interior e Litoral do Estado	Campinas-V.União	55%	45%				22	31	S
	Guaratinguetá*	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jundiaí	84%	16%				19	31	S
	Limeira	73%	27%				20	11	N
	Paulínia-Sta Terezinha	81%	19%				21	31	S
	Piracicaba	87%	13%				19	31	S
	Ribeirão Preto	42%	58%				27	31	S
	Rio Claro-Jd.Guanabara	48%	52%				25	31	S
	S.José Campos-Jd.Satélite*	-	-	-	-	-	-	-	-
	Santa Gertrudes	48%	52%				26	27	S
	Santos-Ponta da Praia	74%	26%				18	31	S
	São José do Rio Preto	74%	26%				22	31	S
Taubaté	100%					16	31	S	

N = Número de dias válidos

Repr. = Atende ao critério de representatividade mensal dos dados : S (sim) e N (não)

* Dados indisponíveis devido a questões operacionais

Rede Manual

Partículas Inaláveis Finas (MP _{2,5}) - Julho/2021 (média de 24 h)						
Estação		Concentração (µg/m ³)				
		05/jul	11/jul	17/jul	23/jul	29/jul
RMSP	Cerqueira César	13	33	11	35	8
	Santo Amaro	11	46	10	28	7
	Santo André - Capuava	12	39	17	30	9

Resultados Fumaça

Parâmetro histórico. Um bom indicador dos processos de combustão na composição da poluição atmosférica. Medido uma vez a cada 6 dias, e por essa razão são apresentados os valores de concentração.

Fumaça - Julho/2021						
Estação		Concentração (µg/m ³)				
		05/jul	11/jul	17/jul	23/jul	29/jul
RMSP	Campos Elíseos	12	37	9	27	9
	Cerqueira César	11	24	11	25	7
	Ibirapuera	7	4	5	35	5
	Pinheiros	9	39	9	20	6
	Tatuapé	8	37	11	25	7
Interior do Estado	Itú	8	-	-	7	7
	Jundiaí	-	-	13	10	10
	Salto	-	17	6	23	10
	Sorocaba*					

- Amostragem Inválida ou Ausência de Dados

*estação sem energia elétrica

Resultados CO

Todos os resultados obtidos nas estações medidoras respeitam os padrões qualidade do ar desde 2008.

Na RMSP, os veículos são responsáveis por cerca de 97% das emissões de CO para a atmosfera.

Monóxido de Carbono (CO) - Julho/2021 (máxima média móvel de 8h)								
Estação	Qualidade e faixa de concentração					N	Repr.	
	Boa	Moderada	Ruim	Muito Ruim	Péssima			
	0 - 9 ppm	>9 - 11 ppm	>11 - 13 ppm	>13 - 15 ppm	>15 ppm			
RMSP	Carapicuíba*	-	-	-	-	-	-	
	Cerqueira César	100%					31 S	
	Congonhas	100%					31 S	
	Guarulhos-Pimentas	100%					31 S	
	Ibirapuera	100%					31 S	
	Marg.Tietê-Ponte dos Remédios	100%					31 S	
	Mooca	100%					31 S	
	Osasco	100%					24 S	
	Parque D.Pedro II	100%					31 S	
	Pinheiros*	-	-	-	-	-	-	
	S.Bernardo-Centro	100%					31 S	
	Santo Amaro*	-	-	-	-	-	-	
	São Caetano do Sul	100%					31 S	
	Taboão da Serra	100%					31 S	
Interior do Estado	Campinas-Centro	100%					31 S	
	Ribeirão Preto	100%					31 S	
	S.José Campos-Jd.Satélite	100%					31 S	

N = Número de dias válidos

Repr. = Atende ao critério de representatividade mensal dos dados : S (sim) e N (não)

* Dados indisponíveis devido a questões operacionais

Resultados SO₂

Resulta principalmente da queima de combustíveis que contém enxofre, como óleo diesel, óleo combustível industrial e gasolina.

É um dos principais precursores da chuva ácida e também responsável pela formação de sulfatos secundários que contribuem para a formação do material particulado na atmosfera.

Dióxido de Enxofre (SO ₂) - Julho/2021 (média de 24 h)								
Estação		Qualidade e faixa de concentração					N	Repr.
		Boa	Moderada	Ruim	Muito Ruim	Péssima		
		0 - 20 µg/m ³	>20 - 40 µg/m ³	>40 - 365 µg/m ³	>365 - 800 µg/m ³	>800 µg/m ³		
RMSP	Cerqueira César	100%					31	S
	Congonhas	100%					31	S
	Guarulhos-Pimentas	100%					31	S
	Interlagos	100%					29	S
	Marg.Tietê-Ponte dos Remédios	100%					31	S
	Osasco	100%					29	S
	S.André-Capuava	100%					31	S
	São Caetano do Sul	100%					31	S
Interior e Litoral do Estado	Cubatão-Centro	97%	3%				30	S
	Cubatão-Vale do Mogi	100%					31	S
	Cubatão-Vila Parisi	94%	3%	3%			31	S
	Paulínia	100%					31	S
	Paulínia-Sta Terezinha	100%					31	S
	S.José Campos	100%					31	S
	Santos-Ponta da Praia	100%					31	S

N = Número de dias válidos

Repr. = Atende ao critério de representatividade mensal dos dados : S (sim) e N (não)

Resultados NO₂

Os óxidos de nitrogênio (NO_x) são lançados na atmosfera durante processos de combustão, envolvendo veículos automotores ou processos industriais. O NO sob a ação de luz solar se transforma em NO₂ que, além de ser um dos poluentes considerados prioritários para a medição, tem papel importante na formação de oxidantes fotoquímicos como o ozônio.

Dióxido de Nitrogênio (NO ₂) - Julho/2021 (máxima média de 1h)							
Estação	Qualidade e faixa de concentração					N	Repr.
	Boa	Moderada	Ruim	Muito Ruim	Péssima		
	0 - 200 µg/m ³	>200 - 240 µg/m ³	>240 - 320 µg/m ³	>320 - 1130 µg/m ³	>1130 µg/m ³		
RMSP	Cerqueira César	100%				31	S
	Congonhas	100%				31	S
	Guarulhos-Pimentas	100%				31	S
	Ibirapuera	100%				31	S
	Interlagos*	-	-	-	-	-	-
	Itaim Paulista	100%				30	S
	Marg.Tietê-Ponte dos Remédios	100%				31	S
	Osasco	100%				30	S
	Parque D.Pedro II	100%				31	S
	Pico do Jaraguá	100%				31	S
	Pinheiros	100%				31	S
	S.André-Capuava	100%				25	S
S.Bernardo-Centro	100%				31	S	
São Caetano do Sul	100%				31	S	
Interior e Litoral do Estado	Araraquara	100%				31	S
	Bauru	100%				31	S
	Campinas-Taquaral	100%				31	S
	Catanduva	100%				31	S
	Cubatão-Centro	100%				29	S
	Cubatão-Vale do Mogi	100%				31	S
	Cubatão-Vila Parisi	100%				31	S
	Guaratinguetá	100%				31	S
	Jacaré	100%				31	S
	Jaú	100%				29	S
	Jundiá	100%				31	S
	Limeira	100%				31	S
	Marília	100%				26	S
	Paulínia	100%				27	S
	Paulínia-Sta Terezinha	100%				1	N
	Piracicaba	100%				26	S
	Presidente Prudente	100%				10	N
	Ribeirão Preto	100%				2	N
	S.José Campos	100%				30	S
	S.José Campos-Jd.Satélite	100%				31	S
Santa Gertrudes	100%				31	S	
Santos-Ponta da Praia	100%				31	S	
São José do Rio Preto*	-	-	-	-	-	-	
Sorocaba	100%				31	S	
Tatuí	100%				26	S	
Taubaté	100%				28	S	

N = Número de dias válidos

Repr. = Atende ao critério de representatividade mensal dos dados : S (sim) e N (não)

* Dados indisponíveis devido a questões operacionais

Resultados ERT

Os compostos de enxofre reduzido (sulfeto de hidrogênio (H_2S), metil-mercaptana (CH_3SH), dissulfeto de carbono (CS_2), sulfeto de carbonila (COS), entre outros, são emitidos por processos industriais diretamente para atmosfera, além de ser também resultado da degradação anaeróbica de matéria orgânica em corpos hídricos. Esses compostos se caracterizam pela sensação de odor desagradável, mesmo em baixa concentração, podendo ocasionar incômodos à população.

Enxofre Reduzido Total (ERT) - Julho/2021 (média horária)								
Estação		Faixa de concentração					Nh	Repr.
		< 5 ppb	>5 – 30 ppb	>30 – 100 ppb	>100 - 200 ppb	>200 ppb		
RMSB	Marginal Tietê-Ponte dos Remédios*	-	-	-	-	-	-	-
Interior	Americana	89,65%	9,62%	0,73%			551	S

Nh = Número de medidas horárias válidas

Repr. = Atende ao critério de representatividade mensal dos dados : S (sim) e N (não)

* Dados indisponíveis devido a questões operacionais

O limite de percepção de odor para o H_2S é de 5 ppb, entretanto, mesmo com 30 ppb de ERT ainda uma parcela da população não detecta o odor. No Brasil não há padrão de qualidade do ar para este poluente.

(Fonte: *The Perception of Hydrogen Sulfide Odour in Relation to Setting an Ambient Air Quality Standard – Final Report Prepared for California Air Resources Board ARB Contract A4-046-33, April 1985*)

Resultados Benzeno e Tolueno

Benzeno e Tolueno são compostos orgânicos voláteis provenientes em grandes centros urbanos, principalmente, das emissões de veículos a gasolina. O benzeno também pode ser emitido em atividades industriais e é utilizado na manufatura de alguns produtos químicos como detergentes, tintas, pigmentos, etc. O Brasil não possui padrão de qualidade do ar para esses poluentes.

Benzeno - Julho/2021							
Estação		Concentração máxima diária ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				N	Repres.
		1ª Máx	2ª Máx	3ª Máx	4ª Máx		
RMSP	Pinheiros*	-	-	-	-	-	-
	Santo André-Capuava	10,8	10,2	9,0	8,0	27	S
Interior e Litoral do Estado	Cubatão-Centro	3,3	3,3	3,2	2,9	20	N
	Paulínia	6,5	4,7	4,4	4,2	31	S
	São José dos Campos	2,7	2,2	2,0	1,9	31	S
	São José dos Campos-Vista Verde	2,5	2,3	2,0	2,0	25	S

N = Número de dias válidos

Repr. = Atende ao critério de representatividade mensal dos dados : S (sim) e N (não)

* Dados indisponíveis devido a questões operacionais

Tolueno - Julho/2021							
Estação		Concentração máxima diária ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				N	Repres.
		1ª Máx	2ª Máx	3ª Máx	4ª Máx		
RMSP	Pinheiros*	-	-	-	-	-	-
	Santo André-Capuava	15,9	12,2	11,1	10,0	27	S
Interior e Litoral do Estado	Cubatão-Centro	6,3	6,1	4,3	3,8	20	N
	Paulínia	13,6	9,3	7,3	7,0	31	S
	São José dos Campos	28,4	23,6	20,6	17,2	31	S
	São José dos Campos-Vista Verde	7,5	7,5	7,4	6,1	25	S

N = Número de dias válidos

Repr. = Atende ao critério de representatividade mensal dos dados : S (sim) e N (não)

* Dados indisponíveis devido a questões operacionais

Resultados Aldeídos

Os aldeídos são emitidos diretamente para a atmosfera por diversas fontes, das quais se destacam os veículos automotores e processos industriais, e podem também ser formados na atmosfera por meio de reações químicas. São também precursores de ozônio. Não há padrão nacional de qualidade do ar.

Aldeídos - Julho/2021					
Estação Santo André-Capuava (RMSP)	Concentração diária (ppb)				
	05/jul	11/jul	17/jul	23/jul	29/jul
Acetaldeído	1,4	3,1	4,2	2,9	1,3
Formaldeído	1,8	3,8	4,3	3,4	1,5

Ocorrências nas Redes de Monitoramento

Rede Automática

- Estação Itaquera: interrupção temporária para reforma e modernização da estação.
- Estação Santos: interrupção temporária devido às reformas nas dependências do Hospital Guilherme Álvaro.

© CETESB 2021

Os dados estão sujeitos a alterações por validações posteriores.

O uso das informações contidas nesse boletim é de inteira responsabilidade do usuário.

É permitida a reprodução total ou parcial deste documento, desde que citada a fonte.