

Apêndice 1 - Valores de Referência Internacionais de Qualidade do Ar

TABELA A – Padrões de qualidade do ar adotados pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA).

POLUENTE	PADRÃO	TEMPO DE AMOSTRAGEM	CONCENTRAÇÃO	FORMA DE ATENDIMENTO
chumbo	primário e secundário	Média Móvel Trimestral	0,15 µg/m ³	Não ser excedido
dióxido de enxofre (SO ₂)	primário	1 h	0,075 ppm	Média de 3 anos do percentil 99 de cada ano, calculado a partir das máximas diárias de 1 hora
	secundário	3 h	0,5 ppm	Não ser excedido mais que uma vez por ano
dióxido de nitrogênio (NO ₂)	primário	1 h	0,100 ppm	Média de 3 anos do percentil 98 de cada ano calculada a partir das máximas diárias de 1 hora.
	primário e secundário	Média Aritmética Anual	0,053 ppm	Média anual
monóxido de carbono (CO)	primário	1 h	35 ppm (40.000 µg/m ³)	Não ser excedido mais que uma vez por ano
		8 h	9 ppm (10.000 µg/m ³)	
ozônio (O ₃)	primário e secundário	8 h	0,070 ppm	Média de 3 anos, da quarta máxima de cada ano, calculada a partir das máximas diárias de oito horas
partículas inaláveis (MP ₁₀)	primário e secundário	24 h	150 µg/m ³	Não deve ser excedido mais de uma vez ao ano, na média de 3 anos
partículas inaláveis finas (MP _{2,5})	primário e secundário	24 h	35 µg/m ³	Média de 3 anos do percentil 98 de cada ano, calculado a partir das médias diárias de 24 horas
	primário	Média Aritmética Anual	12 µg/m ³	Média de 3 anos das médias anuais
	secundário	Média Aritmética Anual	15 µg/m ³	Média de 3 anos das médias anuais

Fonte: CETESB (2022) adaptado de ESTADOS UNIDOS (2017)

Nota:

Padrão Primário - estabelece limites para proteger a saúde pública, incluindo a saúde da população "sensível" como asmáticos, crianças e idosos.

Padrão Secundário - estabelece limites para proteger o bem estar público, incluindo proteção contra a redução da visibilidade, danos a animais, colheita, vegetação e edificações.

TABELA B – Valores guias recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

POLUENTE	CONCENTRAÇÃO (µg/m³)	TEMPO DE AMOSTRAGEM
dióxido de enxofre	40	24 horas
	500	10 minutos
dióxido de nitrogênio	200	1 hora
	25	24h
	10	anual
monóxido de carbono	10000 9 ppm	8 horas
	4000 3,6 ppm	24 horas
ozônio	100	8 horas
	60	pico sazonal*
material particulado MP _{2,5}	5	média aritmética anual
	15	24h (percentil 99)
material particulado MP ₁₀	15	anual
	45	24h (percentil 99)

Fonte: CETESB (2022) adaptado de WHO (2021)

* média das máximas diárias de 8 h em 6 meses consecutivos de maior ocorrência de O₃

TABELA C – Valores de referência adotados pela União Européia

POLUENTE	VALOR LIMITE	VALOR ALVO	CONCENTRAÇÃO	TEMPO DE AMOSTRAGEM	ULTRAPASSAGENS PERMITIDAS / ANO
Dióxido de enxofre (SO ₂)	X		350 µg/m ³	1 hora	24
			125 µg/m ³	24 horas	3
Dióxido de nitrogênio (NO ₂)	X		200 µg/m ³	1 hora	18
			40 µg/m ³	1 ano	--
Partículas inaláveis (MP ₁₀)	X		50 µg/m ³	24 horas	35
			40 µg/m ³	1 ano	--
Partículas inaláveis finas (MP _{2,5})	X		25 µg/m ³	1 ano	--
Chumbo	X		0,5 µg/m ³	1 ano	--
Monóxido de carbono (CO)	X		10 mg/m ³	máxima média 8 horas	--
Benzeno (C ₆ H ₆)	X		5 µg/m ³	1 ano	--
Ozônio (O ₃)		X	120 µg/m ³	máxima média 8 horas	não exceder mais de 25 dias, em média, por ano, num período de 3 anos
Arsênio (As)		X	6 ng/m ³	1 ano	--
Cádmio (Cd)		X	5 ng/m ³	1 ano	--
Níquel (Ni)		X	20 ng/m ³	1 ano	--
Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos		X	1 ng/m ³ ⁽¹⁾	1 ano	--

Fonte: CETESB (2022) adaptado de Europa (2004, 2008)

Nota:

(1) - Expresso como Benzo(a)Pireno

Valor limite - nível fixado com o intuito de evitar, prevenir ou reduzir os efeitos nocivos na saúde humana e no meio ambiente, a atingir num prazo determinado e que, quando atingido não ser excedido.

Valor alvo - nível fixado com o intuito de evitar, prevenir ou reduzir os efeitos nocivos na saúde humana e no meio ambiente, a atingir na medida do possível, num prazo determinado.