



COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Boletim Mensal da Qualidade do Ar para o Estado de São Paulo – Ano 5 – N° 2

Fevereiro de 2024

Boletim Mensal da Qualidade do Ar para o Estado de São Paulo

Ano 5 - Nº 2 - Fevereiro de 2024

Poluição e Saúde

A poluição do ar é um dos mais significantes impactos causados pela atividade humana.

Mesmo com a crescente melhoria na qualidade do ar, o peso das doenças relacionadas com este tipo de poluição aumenta à medida que as populações crescem, envelhecem e se tornam mais susceptíveis a doenças relacionadas com o problema.

A poluição do ar é um fenômeno tipicamente urbano industrial.

Industrial visto que as indústrias, via de regra, lançam poluentes à atmosfera.

Urbano principalmente devido à necessidade de deslocamento de grande número de pessoas, são utilizados vários meios de transporte, a maioria dos quais lança poluentes à atmosfera.

População do Estado em 2023

Número de habitantes

Até 100.000 = 567 municípios

De 100.000 a 400.000 = 63 municípios

De 400.000 a 1.000.000 = 12 municípios

Acima de 1.000.000 = 3 municípios

Total do Estado = 645 municípios com 44.411.238 hab.

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) = 39 municípios com 20.242.666 hab.

São Paulo Capital = 11.451.999 hab.

Fonte: IBGE - censo demográfico de 2022 em 22/12/2023.

Qualidade do ar e efeitos à saúde

Os efeitos à saúde dependem do tipo de poluente e dos níveis dos mesmos na atmosfera.

Na tabela a seguir estão apresentados os efeitos à saúde relacionados à classificação da qualidade do ar para exposição de curto prazo.

Classificação da qualidade do ar e efeitos à saúde – Exposição de curto prazo		
Qualidade	Índice	Significado
N1 - BOA	0 - 40	
N2 – MODERADA	41-80	Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas) podem apresentar sintomas como tosse seca e cansaço. A população, em geral, não é afetada.
N3 – RUIM	81-120	Toda a população pode apresentar sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta. Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas) podem apresentar efeitos mais sérios na saúde.
N4 – MUITO RUIM	121-200	Toda a população pode apresentar agravamento dos sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta e ainda falta de ar e respiração ofegante. Efeitos ainda mais graves à saúde de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas).
N5 – PÉSSIMA	>200	Toda a população pode apresentar sérios riscos de manifestações de doenças respiratórias e cardiovasculares. Aumento de mortes prematuras em pessoas de grupos sensíveis.

A qualificação da qualidade do ar está vinculada à norma legal (Resolução CONAMA nº 491/2018) e independe do padrão de qualidade/meta intermediária em vigor, visto que está associada aos efeitos à saúde humana.

Redes de Medição da Qualidade do Ar

A REDE - O conjunto de equipamentos de medição de qualidade do ar colocados em várias cidades e em locais específicos de cidades paulistas é chamado de “Rede de Monitoramento”. São dois os objetivos principais que a CETESB tem ao operar esta rede. Um deles é a verificação das concentrações de poluentes que a população respira e, portanto, se sua saúde está sendo afetada. O outro é permitir a análise dos dados históricos, obtidos ao longo dos anos, de modo a orientar as ações de controle. O diagnóstico feito pela CETESB é baseado na medição de poluentes e de variáveis meteorológicas, efetuada em diversos tipos de equipamentos. São gerados mensalmente cerca de 500.000 dados nas diferentes redes existentes.

POLUENTES - Cada poluente é monitorado por um equipamento específico. Na denominada **REDE AUTOMÁTICA**, o ar é amostrado, analisado e, em tempo real, os dados são enviados à central alocada na sede da CETESB. Ocorre a divulgação em tempo real à população. Há também estações que possuem equipamentos que coletam amostras que são enviadas a laboratório da CETESB para análise e constituem a denominada **REDE MANUAL**.

METEOROLOGIA - Também faz parte da rede a obtenção de dados meteorológicos visto que a concentração dos poluentes é afetada não só pelos poluentes ali lançados mas também pelo grau de dispersão das substâncias liberadas ao ambiente, destacando-se como agentes importantes os ventos, a chuva e a inversão térmica de baixa altitude.

POPULAÇÃO ATENDIDA - As estações são distribuídas de acordo com o conceito de que a poluição do ar é um fenômeno urbano/industrial. Cidades populosas ou de alta industrialização recebem prioritariamente equipamentos. A racionalização de instalações leva a verificar a qualidade do ar apenas onde há indícios de emissão significativa de poluentes, uma vez que tanto a rede automática e como a rede manual envolvem uma soma expressiva de recursos, tanto em sua aquisição como na operação.

Cidades monitoradas pela CETESB	Número de estações (manuais e automáticas)	População atendida	% do Estado
42	85	25,1 milhões	57%

Fonte: IBGE - censo demográfico de 2022 em 22/12/2023

(<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico-2022.html?edicao=37225&t=resultados>)

Dados de Qualidade do Ar do Mês

Este **BOLETIM** apresenta um resumo dos dados obtidos no mês. Os dados são apresentados de acordo com as redes que os geram. Os produzidos pela rede automática, por serem contínuos, são apresentados com associação aos efeitos à saúde (vide item Poluição e Saúde). Já nos gerados em equipamentos manuais, as amostragens são feitas a cada 6 dias, frequência que possui bastante aderência estatística com média anual, mas não possuem significado maior em termos de caracterizar o mês completo a partir de apenas 5 dados. Por essa razão, para este tipo de medição são apresentados os dados de concentração diretamente, sem qualificação de qualidade do ar.

Atenção ao título das tabelas que contém a informação das médias consideradas, por ser esse o critério de saúde. Assim considera-se para todos os particulados a média de 24 horas, para monóxido de carbono e ozônio, média máxima de oito horas no dia, e para dióxido de nitrogênio a máxima horária observada no dia.

Meteorologia e Poluição do Mês

Em fevereiro, os acumulados de chuva ficaram abaixo das respectivas normais climatológicas em praticamente todas as regiões do estado, com exceção da região litorânea. A maioria das chuvas foi ocasionada por áreas de instabilidade associadas a sistemas de baixa pressão no oceano.

Destaca-se que, durante o mês houve a formação de três sistemas de baixa pressão no oceano, que se estenderam ao longo dos litorais dos estados das Regiões Sudeste e Sul do país. Em meados do mês, um desses sistemas se intensificou até evoluir para uma tempestade tropical, sendo denominada como Tempestade Tropical Akará pela Marinha do Brasil. Sobre a parte continental do estado, houve atuação de áreas de instabilidade associadas a esses sistemas de baixa pressão, que ocasionaram fortes chuvas isoladas, porém impediram a entrada de massas de ar frio, resultando em temperaturas elevadas em diversas regiões do estado. Além disso, na primeira quinzena, houve atuação de massas de ar quente que permaneceram por alguns dias consecutivos, mantendo as temperaturas altas, especialmente em regiões do interior do estado. Neste fevereiro, as médias das máximas temperaturas foram superiores às das respectivas médias climatológicas na maioria das regiões do estado.


Essas situações meteorológicas influenciaram nas condições de dispersão dos poluentes do mês, no entanto, apesar das altas temperaturas, houve poucos dias com condições propícias para formação de concentrações elevadas de ozônio, dias estes em que foram atingidas as qualidades do ar RUIM ou MUITO RUIM para esse poluente, em algumas estações da RMSP, de Campinas, Jundiaí e Santos.

Em relação ao material particulado, a qualidade do ar se manteve BOA na maioria das estações de monitoramento. Entretanto, a estação Cubatão-Vila Parisi, localizada na área industrial de Cubatão, registrou, em 16 dias, as qualidades RUIM, MUITO RUIM ou PÉSSIMA, por MP₁₀.

A qualidade do ar para o dióxido de nitrogênio se manteve predominantemente BOA.

Para os poluentes monóxido de carbono e dióxido de enxofre, a qualidade do ar se manteve BOA.

Ozônio - O₃



O ozônio é um poluente que não é emitido diretamente na atmosfera por nenhuma fonte, mas formado através da reação entre os óxidos de nitrogênio (emitidos por processos de combustão - veicular e industrial) e dos compostos orgânicos voláteis (emitidos em processos evaporativos, queima incompleta de combustíveis automotivos e em processos industriais), na presença de luz solar.

Historicamente as concentrações mais elevadas ocorrem com maior frequência no período de primavera/verão, época em que a incidência da radiação solar é mais intensa e as temperaturas são mais elevadas.

O comportamento do ozônio é apresentado em percentagem de dias que a concentração se situa em cada uma das faixas que são associadas a índices que refletem critérios de efeitos na saúde.

Ozônio (O ₃) - Fevereiro 2024							
Estação	Qualidade e faixa de concentração (Máxima média móvel de 8h)					N	Repr.
	Boa 0 - 100 µg/m ³	Moderada >100 - 130 µg/m ³	Ruim >130 - 160 µg/m ³	Muito Ruim >160 - 200 µg/m ³	Péssima >200 µg/m ³		
RMSP	Capão Redondo	56%	33%	11%		9	N
	Carapicuíba	85%	11%	4%		27	S
	Cid.Universitária-USP-Ipen	64%	29%	7%		28	S
	Diadema	97%	3%			29	S
	Grajaú-Parelheiros	97%	3%			29	S
	Guarulhos-Paço Municipal	93%	7%			29	S
	Guarulhos-Pimentas	90%	7%	3%		29	S
	Ibirapuera	69%	25%	3%	3%	29	S
	Interlagos	86%	11%	3%		29	S
	Itaim Paulista	97%	3%			29	S
	Itaquera	100%				7	N
	Mauá	85%	15%			26	S
	Mooca	83%	17%			29	S
	Nossa Senhora do Ó*	-	-	-	-	-	-
	Parque D.Pedro II	69%	24%	7%		29	S
	Perus	89%	11%			19	N
	Pico do Jaraguá	72%	21%	7%		28	S
	Pinheiros	79%	18%	3%		29	S
	S.André-Capuava	90%	10%			29	S
	S.Bernardo-Centro	76%	18%	3%	3%	29	S
Santana	93%	7%			29	S	
Santo Amaro	86%	11%	3%		28	S	
São Caetano do Sul*	-	-	-	-	-	-	

N = Número de dias válidos

Repr. = Atende ao critério de representatividade mensal dos dados : S (sim) e N (não)

* Dados indisponíveis devido a questões operacionais


Ozônio (O ₃) - Fevereiro 2024							
Estação	Qualidade e faixa de concentração (Máxima média móvel de 8h)					N	Repr.
	Boa 0 - 100 µg/m ³	Moderada >100 - 130 µg/m ³	Ruim >130 - 160 µg/m ³	Muito Ruim >160 - 200 µg/m ³	Péssima >200 µg/m ³		
Interior e Litoral do Estado	Americana	100%				2	N
	Araçatuba	100%				29	S
	Araraquara	100%				29	S
	Bauru	100%				29	S
	Campinas-Taquaral	79%	17%	4%		29	S
	Campinas-V.União	79%	14%	7%		29	S
	Catanduva	100%				29	S
	Cubatão-Centro	93%	7%			29	S
	Cubatão-Vale do Mogi	100%				22	S
	Guaratinguetá	100%				28	S
	Jacaréí	97%	3%			29	S
	Jaú	100%				29	S
	Jundiáí	55%	28%	17%		29	S
	Limeira	100%				29	S
	Marília	100%				29	S
	Paulínia	85%	15%			27	S
	Paulínia-Sta Terezinha	86%	14%			28	S
	Piracicaba	83%	17%			29	S
	Presidente Prudente	100%				29	S
	Ribeirão Preto	100%				28	S
	Rio Claro-Jd.Guanabara	100%				29	S
	S.José Campos	100%				15	N
	S.José Campos-Jd.Satélite	90%	10%			29	S
	Santos	100%				10	N
	Santos-Ponta da Praia	97%		3%		29	S
	São José do Rio Preto	100%				29	S
	São Sebastião	100%				29	S
Sorocaba	100%				29	S	
Tatuí	97%	3%			29	S	
Taubaté	97%	3%			29	S	

N = Número de dias válidos

Repr. = Atende ao critério de representatividade mensal dos dados : S (sim) e N (não)

* Dados indisponíveis devido a questões operacionais

Material Particulado



Constituído de partículas sólidas ou líquidas, pequenas o suficiente para se manterem suspensas no ar. Sem característica química definida, tem importância também pelo tamanho que se apresenta. Destacam-se em termos de saúde as partículas menores que 10 micra, chamadas de partículas inaláveis - **MP₁₀** e também as menores que 2,5 micra, chamadas de partículas inaláveis finas - **MP_{2,5}**. As fontes de emissão de material particulado para a atmosfera são os processos de combustão de veículos, principalmente os movidos a diesel, processos industriais, solo ressuspenso, além de partículas que se formam na atmosfera pela reação de gases, (partículas ou aerossóis secundários).

Resultados MP₁₀

Rede Automática

A apresentação dos dados é feita em percentagem de dias que a concentração se situa em cada uma das faixas que são associadas a índices que refletem critérios de efeitos na saúde.

Partículas Inaláveis (MP ₁₀) - Fevereiro 2024								
Estação	Qualidade e faixa de concentração (média de 24h)					Conc. Média Mensal (µg/m ³)	N	Repr.
	Boa 0 - 50 µg/m ³	Moderada >50 - 100 µg/m ³	Ruim >100 - 150 µg/m ³	Muito Ruim >150 - 250 µg/m ³	Péssima >250 µg/m ³			
RMSP	Capão Redondo**	-	-	-	-	-	-	-
	Carapicuíba**	-	-	-	-	-	-	-
	Cerqueira César	100%					19	29 S
	Congonhas	100%					22	25 S
	Diadema	100%					18	29 S
	Grajaú-Parelheiros	100%					23	29 S
	Guarulhos-Paço Municipal	100%					18	29 S
	Guarulhos-Pimentas	100%					21	29 S
	Interlagos**	-	-	-	-	-	-	-
	Itaim Paulista	100%					19	29 S
	Marg.Tietê-Ponte dos Remédios	100%					23	29 S
	Mauá	100%					30	25 S
	Nossa Senhora do Ó**	-	-	-	-	-	-	-
	Osasco	100%					24	27 S
	Parque D.Pedro II	100%					20	28 S
	Perus	100%					27	23 S
	Pinheiros	100%					19	24 S
	S.André-Capuava	100%					21	29 S
	S.Bernardo-Paulicéia	100%					21	28 S
	Santo Amaro**	-	-	-	-	-	-	-
São Caetano do Sul*	-	-	-	-	-	-	-	
Taboão da Serra**	-	-	-	-	-	-	-	

N = Número de dias válidos

Repr. = Atende ao critério de representatividade mensal dos dados : S (sim) e N (não)

* Dados indisponíveis devido a questões operacionais

** Monitor desativado

Partículas Inaláveis (MP ₁₀) - Fevereiro 2024									
Estação	Qualidade e faixa de concentração (média de 24h)					Conc. Média Mensal (µg/m ³)	N	Repr.	
	Boa 0 - 50 µg/m ³	Moderada >50 - 100 µg/m ³	Ruim >100 - 150 µg/m ³	Muito Ruim >150 - 250 µg/m ³	Péssima >250 µg/m ³				
Interior e Litoral do Estado	Americana	100%					18	29	S
	Araçatuba	100%					14	29	S
	Araraquara	100%					15	29	S
	Bauru	100%					13	29	S
	Campinas-Centro	100%					20	29	S
	Campinas-Taquaral	100%					15	29	S
	Catanduba	100%					19	28	S
	Cubatão-Centro	100%					35	12	N
	Cubatão-Vale do Mogi	100%					29	21	S
	Cubatão-Vila Parisi	28%	17%	7%	45%	3%	126	29	S
	Guaratinguetá	100%					15	27	S
	Jacareí	100%					19	29	S
	Jaú	100%					15	29	S
	Jundiaí	100%					17	29	S
	Limeira	100%					19	24	S
	Marília	100%					15	29	S
	Paulínia	100%					28	28	S
	Paulínia-Sta Terezinha	100%					33	29	S
	Piracicaba	100%					22	29	S
	Presidente Prudente	100%					13	29	S
	Ribeirão Preto	100%					19	29	S
	Rio Claro-Jd.Guanabara	100%					19	27	S
	S.José Campos	100%					21	11	N
	S.José Campos-Jd.Satélite	100%					14	29	S
	Santa Gertrudes	100%					28	29	S
	Santos	100%					21	8	N
	Santos-Ponta da Praia	100%					25	29	S
	São José do Rio Preto*	-	-	-	-	-	-	-	-
São Sebastião	78%	22%				26	9	N	
Sorocaba	100%					20	29	S	
Tatuí	100%					17	23	S	
Taubaté	100%					13	29	S	

N = Número de dias válidos

Repr. = Atende ao critério de representatividade mensal dos dados : S (sim) e N (não)

* Dados indisponíveis devido a questões operacionais

Rede Manual

São apresentados os dados de concentração obtidos a cada 6 dias.

Partículas Inaláveis (MP ₁₀) - Fevereiro/2024						
Estação		Concentração média de 24h (µg/m ³)				
		04/fev	10/fev	16/fev	22/fev	28/fev
Interior do Estado	Cordeirópolis - Módolo	14	26	16	20	37
	Franca - Cidade Nova	9	13	11	9	20
	Guarujá - Vicente de Carvalho	-	-	-	-	-
	Jaboticabal - Jd Kennedy	10	18	18	17	-
	Santa Gertrudes - Jd. Luciana	18	34	31	33	46

- amostragem inválida ou ausência de dados

Resultados MP_{2,5}

Rede Automática

Assim como os dados de MP₁₀ obtidos automaticamente, os dados de MP_{2,5} são apresentados por faixas de concentração associadas a critérios de saúde.

Partículas Inaláveis Finas (MP _{2,5}) - Fevereiro 2024									
Estação	Qualidade e faixa de concentração (média de 24h)					Conc. Média Mensal (µg/m ³)	N	Repr.	
	Boa 0 - 25 µg/m ³	Moderada >25 - 50 µg/m ³	Ruim >50 - 75 µg/m ³	Muito Ruim >75 - 125 µg/m ³	Péssima >125 µg/m ³				
RMSP	Capão Redondo**	100%					9	29	S
	Carapicuíba**	100%					11	29	S
	Cid.Universitária-USP-Ipen	100%					11	29	S
	Congonhas	100%					14	25	S
	Grajaú-Parelheiros	100%					11	29	S
	Guarulhos-Paço Municipal	100%					13	27	S
	Guarulhos-Pimentas	100%					10	29	S
	Ibirapuera	100%					10	9	N
	Interlagos**	100%					7	28	S
	Itaim Paulista	100%					11	29	S
	Marg.Tietê-Ponte dos Remédios	100%					15	29	S
	Mauá	100%					13	25	S
	Mooca	100%					12	28	S
	Nossa Senhora do Ó**	100%					9	28	S
	Osasco	100%					13	27	S
	Parque D.Pedro II	100%					13	27	S
	Perus	100%					8	19	N
	Pico do Jaraguá	100%					11	7	N
	Pinheiros	100%					11	23	S
	S.Bernardo-Centro	100%					11	29	S
Santana	100%					12	29	S	
Santo Amaro**	100%					11	27	S	
São Caetano do Sul*	-	-	-	-	-	-	-	-	
Taboão da Serra**	94%	6%				11	17	N	
Interior e Litoral do Estado	Campinas-V.União	100%					11	29	S
	Guaratinguetá	100%					10	26	S
	Jundiaí	100%					10	29	S
	Limeira	100%					9	24	S
	Paulínia-Sta Terezinha	100%					9	29	S
	Piracicaba	100%					9	29	S
	Ribeirão Preto	100%					7	29	S
	Rio Claro-Jd.Guanabara	100%					10	29	S
	S.José Campos-Jd.Satélite	100%					8	29	S
	Santa Gertrudes*	-	-	-	-	-	-	-	-
	Santos-Ponta da Praia	100%					11	29	S
	São José do Rio Preto*	-	-	-	-	-	-	-	-
	São Sebastião	100%					6	10	N
Taubaté	100%					8	29	S	

N = Número de dias válidos

Repr. = Atende ao critério de representatividade mensal dos dados : S (sim) e N (não)

* Dados indisponíveis devido a questões operacionais

** Monitor novo

Rede Manual

São apresentados os dados de concentração obtidos a cada 6 dias.

Partículas Inaláveis Finas (MP _{2,5}) - Fevereiro/2024						
Estação		Concentração média de 24h (µg/m ³)				
		04/fev	10/fev	16/fev	22/fev	28/fev
RMSP	Cerqueira César	10	11	8	9	13
	Santo Amaro	11	11	5	7	-
	Santo André - Capuava	10	13	10	7	13

- amostragem inválida ou ausência de dados

Resultados Fumaça

Parâmetro histórico. Um bom indicador dos processos de combustão na composição da poluição atmosférica. Medido uma vez a cada 6 dias, e por essa razão são apresentados os valores de concentração.

Fumaça (FMC) - Fevereiro/2024						
Estação		Concentração média de 24h (µg/m ³)				
		04/fev	10/fev	16/fev	22/fev	28/fev
RMSP	Cerqueira César	16	8	8	15	19
	Ibirapuera	9	6	6	5	9
	Pinheiros	-	4	6	-	14
	Tatuapé	<3	7	7	10	18
Interior do Estado	Itú	<3	5	4	6	13
	Jundiaí	10	6	<3	7	-
	Salto	4	6	7	7	14
	Sorocaba	5	<3	-	-	-

- amostragem inválida ou ausência de dados


Resultados PTS

As Partículas Totais em Suspensão expressam as medições do conjunto das partículas que se mantêm suspensas na atmosfera, desde as menores que 10 µm (MP₁₀ e MP_{2,5}) até as com cerca de 50 µm. Embora uma parte destas partículas seja inalável, são medidas principalmente para se avaliar o grau de sujeidade presente em áreas específicas.

Partículas Totais em Suspensão (PTS) - Fevereiro/2024						
Estação		Concentração média de 24h (µg/m ³)				
		04/fev	10/fev	16/fev	22/fev	28/fev
RMSP	Cerqueira César	41	-	34	-	-
	Osasco	56	61	60	58	-
	Pinheiros	37	38	32	34	46
	Santo Amaro	27	34	22	27	-
	Santo André - Capuava	29	40	27	28	45
	São Bernardo do Campo	27	44	112	29	38
LITORAL	Cubatão - Vila Parisi	300	838	153	131	763

- amostragem inválida ou ausência de dados

Monóxido de carbono - CO



É um gás incolor e inodoro. Emitido em processos de combustão. Os veículos são responsáveis por cerca de 95% das emissões na RMSP.

Todos os resultados obtidos nas estações medidoras respeitam os padrões qualidade do ar desde 2008.

Na RMSP, os veículos são responsáveis por cerca de 95% das emissões de CO para a atmosfera.


Monóxido de Carbono (CO) - Fevereiro 2024							
Estação	Qualidade e faixa de concentração (máxima média móvel de 8h)					N	Repr.
	Boa 0 - 9 ppm	Moderada >9 - 11 ppm	Ruim >11 - 13 ppm	Muito Ruim >13 - 15 ppm	Péssima >15 ppm		
RMSP	Carapicuíba	100%				26	S
	Cerqueira César	100%				29	S
	Congonhas	100%				9	N
	Grajaú-Parelheiros	100%				29	S
	Guarulhos-Pimentas	100%				29	S
	Ibirapuera	100%				29	S
	Marg.Tietê-Ponte dos Remédios	100%				29	S
	Mooca	100%				29	S
	Osasco	100%				29	S
	Parque D.Pedro II	100%				29	S
	Pinheiros	100%				29	S
	S.Bernardo-Centro	100%				29	S
	Santo Amaro	100%				28	S
	São Caetano do Sul*	-	-	-	-	-	-
Taboão da Serra*	-	-	-	-	-	-	
Interior do Estado	Campinas-Centro	100%				29	S
	Ribeirão Preto	100%				29	S
	S.José Campos-Jd.Satélite	100%				23	S

N = Número de dias válidos

Repr. = Atende ao critério de representatividade mensal dos dados : S (sim) e N (não)

* Dados indisponíveis devido a questões operacionais

Dióxido de enxofre - SO₂



É um gás incolor, resultante principalmente da queima de combustíveis que contêm enxofre, como óleo diesel, óleo combustível industrial e gasolina. É um dos principais precursores da chuva ácida e também responsável pela formação de sulfatos secundários que contribuem para a formação do material particulado na atmosfera.


Dióxido de Enxofre (SO ₂) - Fevereiro 2024									
Estação		Qualidade e faixa de concentração (média de 24h)					Conc. Média Mensal (µg/m ³)	N	Repr.
		Boa 0 - 20 µg/m ³	Moderada >20 - 40 µg/m ³	Ruim >40 - 365 µg/m ³	Muito Ruim >365 - 800 µg/m ³	Péssima >800 µg/m ³			
RMSP	Cerqueira César	100%					1	19	N
	Congonhas	100%					2	25	S
	Guarulhos-Pimentas	100%					3	17	N
	Interlagos	100%					1	18	N
	Marg.Tietê-Ponte dos Remédios	100%					2	25	S
	Osasco	100%					2	27	S
	S.André-Capuava	100%					2	29	S
	São Caetano do Sul*	-	-	-	-	-	-	-	-
Interior e Litoral do Estado	Cubatão-Centro*	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cubatão-Vale do Mogi	100%					5	20	S
	Cubatão-Vila Parisi	100%					3	26	S
	Paulínia	100%					3	28	S
	Paulínia-Sta Terezinha*	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.José Campos	100%					1	6	N
	Santos-Ponta da Praia	100%					3	29	S

N = Número de dias válidos

Repr. = Atende ao critério de representatividade mensal dos dados : S (sim) e N (não)

* Dados indisponíveis devido a questões operacionais

Dióxido de nitrogênio - NO₂



Os óxidos de nitrogênio (NO_x) são lançados na atmosfera durante processos de combustão, envolvendo veículos automotores ou processos industriais. O NO sob a ação de luz solar se transforma em NO₂ que, além de ser um dos poluentes considerados prioritários para a medição, tem papel importante na formação de oxidantes fotoquímicos como o ozônio.


Dióxido de Nitrogênio (NO ₂) - Fevereiro 2024									
Estação	Qualidade e faixa de concentração (máxima média de 1h)					Conc. Média Mensal (µg/m ³)	N	Repr.	
	Boa 0 - 200 µg/m ³	Moderada >200 - 240 µg/m ³	Ruim >240 - 320 µg/m ³	Muito Ruim >320 - 1130 µg/m ³	Péssima >1130 µg/m ³				
RMSP	Cerqueira César	100%					37	23	S
	Congonhas	96%	4%				62	25	S
	Guarulhos-Paço Municipal*	-	-	-	-	-	-	-	-
	Guarulhos-Pimentas	100%					21	29	S
	Ibirapuera	100%					19	29	S
	Interlagos	100%					21	23	S
	Itaim Paulista	100%					26	29	S
	Marg.Tietê-Ponte dos Remédios	100%					54	9	N
	Osasco	100%					43	27	S
	Parque D.Pedro II	100%					31	27	S
	Pico do Jaraguá	100%					16	28	S
	Pinheiros	100%					34	21	S
	S.André-Capuava	100%					17	29	S
	S.Bernardo-Centro	100%					31	29	S
São Caetano do Sul*	-	-	-	-	-	-	-	-	
Interior e Litoral do Estado	Araraquara	100%					10	27	S
	Bauru	100%					9	28	S
	Campinas-Taquaral	100%					9	29	S
	Catanduva	100%					10	28	S
	Cubatão-Centro*	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cubatão-Vale do Mogi	100%					29	10	N
	Cubatão-Vila Parisi	100%					51	27	S
	Guaratinguetá*	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jacareí	100%					10	29	S
	Jaú	100%					10	29	S
	Jundiaí	100%					22	29	S
	Limeira	100%					16	24	S
	Marília	100%					8	29	S
	Paulínia	100%					16	28	S
	Paulínia-Sta Terezinha	100%					3	27	S
	Piracicaba	100%					15	29	S
	Presidente Prudente	100%					7	29	S
	Ribeirão Preto	100%					16	28	S
	S.José Campos	100%					17	13	N
	S.José Campos-Jd.Satélite	100%					15	29	S
	Santa Gertrudes	100%					21	29	S
Santos-Ponta da Praia	100%					27	29	S	
São José do Rio Preto	100%					12	29	S	
Sorocaba	100%					13	29	S	
Tatuí	100%					7	29	S	
Taubaté	100%					9	29	S	

N = Número de dias válidos

Repr. = Atende ao critério de representatividade mensal dos dados : S (sim) e N (não)

* Dados indisponíveis devido a questões operacionais

Compostos de enxofre reduzido - ERT



Os compostos de enxofre reduzido (ERT) mais frequentes e abundantes são: sulfeto de hidrogênio (H_2S), metil-mercaptana (CH_3SH), dimetil-sulfeto ($(CH_3)_2S$) e dimetil-dissulfeto ($(CH_3)_2S_2$). São emitidos por processos industriais diretamente para atmosfera, além de ser também resultado da degradação anaeróbica de matéria orgânica em corpos hídricos. Esses compostos se caracterizam pela sensação de odor desagradável, mesmo em baixa concentração, podendo ocasionar incômodos à população.

Enxofre Reduzido Total (ERT) - Fevereiro/2024								
Estação		Faixa de concentração (média horária)					Nh	Repr.
		< 5 ppb	>5 – 30 ppb	>30 – 100 ppb	>100 - 200 ppb	>200 ppb		
RMSP	Marginal Tietê - Ponte dos Remédios	91,21%	8,79%				637	S
Interior	Americana	94,60%	5,25%	0,15%			667	S


Nh = Número de medidas horárias válidas

Repr. = Atende ao critério de representatividade mensal dos dados : S (sim) e N (não)

No Brasil não há padrão de qualidade do ar para ERT. Não existe limite de percepção de odor para os compostos de enxofre reduzido total como um todo, e sim para seus componentes individuais. O limite de percepção de odor para H_2S é de 5 ppb, por outro lado algumas mercaptanas possuem limites de percepção de odor ainda menores. Há vários fatores que afetam a sensibilidade ao odor, sendo que mesmo com concentrações de 30 ppb de H_2S (padrão de qualidade do ar adotado na Califórnia) ainda uma parcela da população não detectaria o odor¹.

¹ The Perception of Hydrogen Sulfide Odour in Relation to Setting an Ambient Air Quality Standard – Final Report Prepared for California Air Resources Board ARB Contract A4-046-33, April 1985

Benzeno e Tolueno



Benzeno e Tolueno são compostos orgânicos voláteis provenientes em grandes centros urbanos, principalmente, das emissões de veículos a gasolina. O benzeno também pode ser emitido em atividades industriais e é utilizado na manufatura de alguns produtos químicos como detergentes, tintas, pigmentos, etc. O Brasil não possui padrão de qualidade do ar para esses poluentes.

Benzeno - Fevereiro/2024 (média horária)								
Estação		Faixa de concentração					Nh	Repr.
		< 2 µg/m ³	>2 – 5 µg/m ³	>5 – 10 µg/m ³	>10 - 20 µg/m ³	>20 µg/m ³		
RMSP	Pinheiros*	-	-	-	-	-	-	-
	Santo André-Capuava	83,00%	11,24%	4,47%	1,15%	0,14%	694	S
Interior e Litoral do Estado	Cubatão-Centro*	-	-	-	-	-	-	-
	Paulínia	95,31%	4,69%				64	N
	São José dos Campos	97,65%	1,88%	0,47%			213	N
	São José dos Campos - Vista Verde	75,59%	15,09%	6,95%	2,37%		676	S

Nh = Número de medidas horárias válidas

Repr. = Atende ao critério de representatividade mensal dos dados : S (sim) e N (não)

* Dados indisponíveis devido a questões operacionais


Tolueno - Fevereiro/2024 (média horária)								
Estação		Faixa de concentração					Nh	Repr.
		<6 µg/m ³	>6 – 15 µg/m ³	>15 – 30 µg/m ³	>30 - 60 µg/m ³	>60 µg/m ³		
RMSP	Pinheiros*	-	-	-	-	-	-	-
	Santo André-Capuava	95,97%	3,60%	0,43%			694	S
Interior e Litoral do Estado	Cubatão-Centro*	-	-	-	-	-	-	-
	Paulínia	100,00%					64	N
	São José dos Campos	94,37%	5,16%		0,47%		213	N
	São José dos Campos - Vista Verde	81,36%	17,31%	1,33%			676	S

Nh = Número de medidas horárias válidas

Repr. = Atende ao critério de representatividade mensal dos dados : S (sim) e N (não)

* Dados indisponíveis devido a questões operacionais

Aldeídos



Os aldeídos são emitidos diretamente para a atmosfera por diversas fontes, das quais se destacam os veículos automotores e processos industriais, e podem também ser formados na atmosfera por meio de reações químicas. São também precursores de ozônio. Não há padrão nacional de qualidade do ar.

Aldeídos - Fevereiro/2024					
Estação Congonhas (RMSP)	Concentração média de 24h (ppb)				
	04/fev	10/fev	16/fev	22/fev	28/fev
Acetaldeído	-	1,8	-	2,0	2,6
Formaldeído	-	3,5	-	3,3	4,4

- amostragem inválida ou ausência de dados

Ocorrências nas Redes de Monitoramento

Rede Automática

- Sem ocorrências

Rede Manual

- Sem ocorrências.

© CETESB 2024

Os dados estão sujeitos a alterações por validações posteriores.

O uso das informações contidas nesse boletim é de inteira responsabilidade do usuário.

É permitida a reprodução total ou parcial deste documento, desde que citada a fonte.